







# EPONIMOS EN UROLOGÍA Y ANDROLOGÍA (A-F)

**EPÓNIMO:** persona, real o ficticia, que da el nombre a una enfermedad, estructura anatómica, procedimiento diagnóstico o terapéutico, clasificación, o un instrumento que por alguna razón está asociado con él/ella

	EPONIMO	DEFINICIÓN	
<b>A</b>	ALBARRÁN, PUENTE	Instrumento para la endoscopia del tracto urinario inferior. Tiene una palanca de control proximal que opera un brazo móvil distal que permite orientar las guías y los catéteres ureterales	 P. Alken
	ALCOCK, CANAL	Estructura anatómica formada por la división de la fascia del músculo obturador interno. Contiene la arteria y vena pudendas internas y el nervio pudendo	
	ALKEN, DILATADORES	Dilatadores telescópicos metálicos utilizados para la dilatación del tracto durante la nefrolitotomía percutánea	
	ALPORT, SINDROME	Enfermedad genética ligada al cromosoma X (gen COL4A5) que causan alteraciones del colágeno tipo IV. Síntomas: hematuria, sordera neurosensorial, insuficiencia renal progresiva, anomalías oculares	
	AMPLATZ, DILATADORES	Dilatadores plásticos utilizados para la dilatación del tracto durante la nefrolitotomía percutánea	
	ANDERSON-HYNES PIELOPLASTIA	Tratamiento quirúrgico de la estenosis de la unión pieloureteral en el niño	
<b>B</b>	BARDET-BIEDL, SINDROME	Enfermedad genética autosómica recesiva. Pertenecce a la familia de las ciliopatías. Síntomas: obesidad, retinitis pigmentosa, polidactilia, riñones poliquisticos, hipogonadismo y dificultades de aprendizaje	 M.A. Bosniak
	BECKWITH-WIDMANN, SINDROME	Enfermedad causada por alteraciones en el cromosoma 11p15.5. Generalmente, tiene un inicio esporádico. Síntomas: macrosomía fetal, macroglosia, hemihipertrofia, hipoglucemia, hernia umbilical, desarrollo de neoplasias (frecuentemente tumor de Wilms)	
	BEHCET, SINDROME	Vasculitis crónica multisistema recurrente. Síntomas: aftas orales y genitales, artritis, uveítis, eritema nodoso, tromboflebitis, st. neurológicos	
	BELLINI, CA. DE CONDUCTO	Tumor maligno renal originado en los conductos recolectores. Raro y mal pronóstico	
	BERDON, SINDROME	Enfermedad genética autosómica recesiva. Síntomas: megavejiga, hidronefrosis, microcolo e hipoperistalsis intestinal	
	BIRT-HOGG-DUB, SINDROME	Enfermedad genética autosómica dominante causada por una mutación del gen de la foliulina (17p11.2). Síntomas: fibromas cutáneos, quistes pulmonares y tumores renales (desde oncocitoma benigno hasta carcinoma de células renales)	
	BONNEY, TEST	Evaluación de la pérdida de orina haciendo que el paciente tosa durante la inspección vaginal mientras el cuello de la vejiga se eleva ligeramente con un dedo o instrumento. Esta maniobra permite comprobar si la incontinencia urinaria es por descenso del cuello durante el esfuerzo físico	
	BOSNIAK, CLASIFICACION	Clasificación basada en TC con contraste que clasifica los quistes renales en función de la probabilidad de su neoplasia maligna	
	BOWEN, ENFERMEDAD	Carcinoma escamoso in situ que puede afectar la piel del pene (PIN)	
	BRACCI, CATÉTER	Catéter ureteral utilizado en procedimientos de ureterostomías cutáneas	
	BRACCI, SEPARADOR	Separador abdominal utilizado típicamente en la adenomecтомía transvesical para la HPB	
	BRICKER, ANASTOMOSIS	Derivación urinaria no continente (ureteroileocutaneostomía) tras una cistectomía radical	
	BRÖDEL, LÍNEA	Línea relativamente avascular entre la arteria segmentaria renal anterior y posterior. Se extiende por el borde lateral convexo del riñón (unión entre 2/3 anterior y 1/3 posterior del parénquima). Constituye un punto de entrada al sistema calicial que permite reducir el riesgo de sangrado	
BUCK, FASCIA	Fascia fibrosa profunda del pene que recubre cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso		
BUSCHKE-LÖWENSTEIN, TUMOR	Carcinoma verrucoso asociado con la infección por VPH que afecta el área anogenital. Histológicamente bien diferenciado. Se caracteriza por un crecimiento lento y localmente invasivo		
<b>C</b>	CALMETTE-GUÉRIN, BACILO	También llamado BCG. Cepa atenuada de Mycobacterium Bovis que se utiliza como inmunoterapia intravesical tras la resección vesical de tumores no muscular infiltrantes de alto riesgo (terapia adyuvante)	 A. Calmette C. Guérin
	CAMEY, NEOVEJIGA ORTOTÓPICA	Derivación urinaria continente creada tras una cistectomía radical. Se utiliza un segmento de ileon se utiliza para hacer la neovejiga	
	CAMPER, FASCIA	Fascia adiposa superficial de la pared abdominal anterior. Más superficial que la fascia de Scarpa	
	CHARRIERE, ESCALA	También llamada escala francesa. Un sistema utilizado para medir el diámetro exterior de los catéteres y otros dispositivos tubulares. 1 mm equivale a 3 Ch (Fr)	
	COLLES, FASCIA	Fascia membranosa superficial del perineo	
	COLLINS, ASA	Asa diatérmica cuneiforme utilizada en la cirugía endoscópica del tracto urinario inferior (p. ej. resección en bloque del tumor vesical)	
	COUVELAIRE, CATÉTER	Catéter vesical con punta recta que está abierta como el pico de una flauta. Es útil en caso de sangrado vesical con coágulos	
	COWDEN, SINDROME	Enfermedad genética autosómica dominante. Mutación PTEN en el cromosoma 10 (10q23.2). Síntomas: lesiones mucocutáneas (cara y cavidad oral), pólipos hamartomatosos intestinales, tumores malignos de mama, tiroides, endometrio, colon, recto y riñón	
	COWPER, GLÁNDULAS	Glándulas bulbouretrales situadas en el espesor del diafragma urogenital. Secretan líquido preseminal	
<b>D</b>	DARTOS, FASCIA	Fascia fibromuscular lisa presente en el escroto y pene (fascia superficial del pene)	 E. Dormia
	DEAVER, SEPARADOR	Separador utilizado en cirugía abdominal. Es útil durante la implantación de prótesis de pene de tres componentes	
	DEL CASTILLO, SINDROME	Infertilidad masculina caracterizada por la presencia en los túbulos seminíferos sólo de células de Sertoli (falta de células germinales)	
	DENONVILLIERS, FASCIA	Fascia que se interpone entre el recto y la próstata y las vesículas seminales	
	DENYS-DRASH SINDROME	Enfermedad esporádica asociada con mutaciones del gen WT1 (11p13). Síntomas: esclerosis mesangial, nefroblastoma, pseudomafroditismo	
	DORMIA, CESTA	Cesta flexible utilizada en endoscopia (por ejemplo, ureteroscopia) para la extracción de material (por ejemplo, fragmentos de piedra)	
	DOWN, SINDROME	Enfermedad genética causada por la trisomía del cromosoma 21. Se asocia con malformaciones genitourinarias, STUI, incontinencia urinaria o retención, infecciones, criptorquidia, infertilidad	
	DUBIN-AMELAR, CLASIFICACIÓN	Clasificación clínica de varicocele. Grado: I palpable durante maniobra de Valsalva; II palpable en reposo; III grado: visible	
	DUFOUR, CATETER	Catéter vesical con una punta en ángulo que está abierta como el pico de una flauta. Es útil en caso de sangrado vesical con coágulos	
<b>E</b>	EAGLE-BARRETT, SINDROME	También llamado síndrome de Prune-Belly. Enfermedad congénita generalmente esporádica. Obstrucción uretral. Síntomas: falta de desarrollo de los músculos abdominales, distensión vesical, ureterohidronefrosis, criptorquidia bilateral	 M. Elik
	EDWARDS, SINDROME	Enfermedad genética causada por la trisomía del cromosoma 18. Síntomas: Retraso del crecimiento pre y postnatal, microcefalia, micrognatia, occipucio prominente, hipertelorismo, malformaciones de los oídos con baja implantación, anomalías en pie y mano, malformaciones cardíacas, malformaciones del tracto digestivo, genitourinarias, criptorquidia	
	EHLERS-DANLOS, SINDROME	Enfermedad genética del tejido conectivo. Existen diferentes formas causadas por mutaciones de diferentes genes, pero casi todas son autosómicas dominantes. Síntomas: hiperelasticidad de la piel, hiperlaxitud articular, fragilidad tisular, divertículos vesicales...	
	ELLIK, EVACUADOR	Dispositivo utilizado para evacuar el material de la vejiga (por ejemplo: coágulos, fragmentos de próstata después de la RTU...)	
	ELSBERG, SINDROME	Radiculitis lumbosacra con mielitis causada por el VHS-2. Síntomas: RAO, estreñimiento y síntomas sensoriales lumbosacros	
<b>F</b>	FOLEY, CATETER	Catéter vesical con punta recta que tiene dos orificios opuestos y simétricos	 J.A. Fournier
	FOURNIER, GANGRENA	Fascitis necrosante que afecta los tejidos blandos de la región genital, perineal y perianal	
	FOWLER, SINDROME	Retención urinaria crónica en mujeres jóvenes causada por la mala relajación del esfínter externo en ausencia de enfermedades neurológicas	
	FREYER, PROSTATECTOMÍA	Tratamiento quirúrgico de la HBP. Consiste en la extirpación del adenoma prostático con acceso extraperitoneal transvesical	
	FURHRMAN CLASIFICACIÓN	Sistema de clasificación utilizado para evaluar la diferenciación de los tumores renales	
FURLOW, INSTRUMENTO	Instrumento utilizado para la colocación intracavernosa de los cilindros de una prótesis del pene de tres componentes		